

· 信息之窗 ·

抗生素与中药合用的利与弊

《甘肃中医学院学报》1992年第1期对抗生素与中药合用的利与弊进行了阐释。

1. 可增强疗效与减少毒副作用的配伍：链霉素与甘草合用，可降低其毒害性；青霉素与金银花合用，能加强青霉素对耐药性金黄色葡萄球菌的抑制作用；灰黄霉素与茵陈合用，可增大灰黄霉素的溶解度，提高其生物利用度，并能减少用量约33%~50%；红霉素、四环素等与碱性中药如硼砂、瓦楞子等同服，可防止抗生素被胃酸破坏，四环素与酸性中药如乌梅、女贞子、五味子等合用，可增加吸收；抗生素与小柴胡汤合用，可减少抗生素的副作用。

2. 抗生素与中药不相宜的配伍：四环素类药物不宜与含金属离子的中药及炭剂配伍，以免形成难溶性螯合物降低吸收；某些抗生素如氯霉素、红霉素、利血平等不宜与含鞣质的中药如石榴皮、五倍子、地榆、大黄等配伍，以免产生沉淀，使抗生素失活；链霉素、卡那霉素、庆大霉素等不宜与碱性中药同用，抗菌力虽增强，但药物分布到脑组织中的浓度升高，而毒性增大；四环素与碱性中药合用，能减弱吸收，降低抗菌力。

解表方药的研究

《医药信息论坛》1992年5月14日报道了对解表方药的新研究：1. 辛温方麻黄汤发汗力强，辛凉方银翘散未见发汗作用。麻黄汤的发汗作用在麻醉状态下无效。2. 麻黄汤对多种致热源引起的发热均无明显影响，但九味羌活汤、桂枝汤、香薷饮则有一定的解热作用；而银翘散、桑菊饮有明显解热作用。3. 辛温方（除九味羌活汤、桂枝汤外）有抗啤酒酵母和安痛定所致体温下降的作用，而辛凉方桑菊饮、银翘散与其相反，使低体温进一步下降。4. 辛温方可使正常动物体温略有升高，辛凉方则略有降低。5. 辛温方有较强的镇痛作用，而辛凉方作用较弱或不明显。6. 两类解表方对大鼠

足肿和毛细血管通透性均有一定抑制作用，其抗炎强度以桑菊饮、银翘散为最佳。7. 对非特异免疫功能的影响，与两类方剂剂量有关，大剂量可抑制；对特异性免疫功能的影响：辛温方促进细胞免疫，而辛凉方抑制细胞免疫；对抗内毒素抗体产生：两类方剂均明显地促进抗体产生，而桑菊饮抑制抗体产生。8. 辛凉方对常见致病菌的抑制作用较辛温方稍强。9. 麻黄汤、香薷饮使血糖升高，肝糖元降低，并能促进糖酵解，而银翘散作用相反，其余方剂作用无规律性。10. 辛温方对离体肠肌表现为小剂量兴奋，大剂量抑制；辛凉方则无明显影响。

耳针戒烟

据《浙江中医学院学报》1992年第1期报道，耳针戒烟方法为取耳穴肺、胃、神门，用揸针埋藏，外以胶布固定，每次取3穴，3天一换，每次取一耳，两耳交替，3次为1疗程。揸针埋后须一天数次按压，尤其是想吸烟时，立刻以手指按压，或达到剧痛，或达到耳壳发热或充血。除烟龄长、烟量大者外，均以1个疗程为限观察疗效。结果：51例中，痊愈28例（1支不吸者），显效13例（每天5支以下者），有效4例（烟量减少50%者），无效6例。痊愈率54%，总有效率88.24%。

耳穴点压催经抗早孕

《内蒙古中蒙医药情报》消息，一种非手术非药物的节育方法——耳穴点压催经抗早孕最近在内蒙古赤峰市通过盟级科技成果鉴定。耳穴点压法具有催经、抗着床、止孕三种功效。在受精卵尚未植入或正在植入过程中使用，可催经下血，促使子宫内膜提前脱落，干扰受精卵植入，起到抗着床作用；若已发育成胚胎，可通过催经下血促其流产；若属经闭，则可通经。其催经抗着床有效率为95.24%。该法无副作用，具有操作简便、易于掌握、便于推广等特点，是一种优于其他节育措施的方法。

六味地黄丸预防癌症

据《中国医药报》1992年5月21日报道，